

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ



Сроки использования яичной птицы составляют от 1,5 до 3-х лет и более. Как следствие, птица испытывает постоянную интенсивную нагрузку на внутренние органы, в особенности на печень. Это связано с потреблением корма, а также с особенностями формирования скорлупы яичной птицей.



Печень с выраженной жировой дистрофией у яичной птицы не способна эффективно осуществлять транспорт кальция, а также производит недостаточное количество аминокислот для формирования белковых волосков скорлупы. Скорлупа в этом случае будет хрупкой, увеличится количество боя и насечки, снизится продолжительность пика продуктивности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PROVIMI®:

- Индивидуальный подход к корректировке программы кормления;
- Использование технологии, направленной на восстановление функции печени:
 - **уникальный состав активных ингредиентов** для улучшения обмена веществ и поддержания функции печени
 - **усиленная комбинация витаминов группы В** для снижения действия стресс-факторов
 - **поддержание кальциевого обмена и оптимального пищеварения** для снижения количества боя, насечки и грязного яйца.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ PROVIMI® - ЭТО:

- **Увеличение продуктивности до 2 %;**
- Снижение боя и насечки на 20 %
(от общего количества поврежденного яйца);
- Улучшение сохранности до 5 %.