



Повышение эффективности использования энергии у ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Преимущества продукта

- Увеличение молочной продуктивности и среднесуточного прироста живой массы до 4 – 8 %
- Снижение стоимости корма путем повышения усвояемости энергии или за счет использования источников быстросрасщепляемых углеводов
- Минимальный возврат инвестиций 5 : 1
- Повышает эффективность откорма и качество мяса у мясного скота
- Предотвращает ацидоз и сопутствующие проблемы

Рекомендуемая дозировка

**5 – 6 г/гол./день
для молочного скота**

в зависимости от молочной продуктивности, например, 5 г/гол. при удое 20–30 л/день

2 – 6 г/гол./день для мясного скота


в зависимости от живой массы, например, 1 г на 100 кг живой массы

**1 г/гол./день для овец, коз
0,8 – 1 г/гол./день для ягнят**



АКТИФОР® ПАУЭР ЭФФЕКТИВЕН

- В полнормешанных рационах и при раздельном кормлении грубыми кормами и концентратами
- При расщеплении неструктурных углеводов, клетчатки, жира и протеина
- В различных частях пищеварительного тракта
- За счет усиленного взаимодействия между фитогенными веществами



Фитогенные вещества

Эфирные масла

Подобраны по влиянию на образование летучих жирных кислот и скорость расщепления неструктурных углеводов бактериями в рубце.

Натуральные специи

Тщательно подобраны и скомбинированы для улучшения переваримости крахмала и жира в тонком кишечнике.

Синергетическое воздействие на поступление протеина и энергии



Увеличение молочной продуктивности

влияние на молочную продуктивность (л/день)




Схема опыта в США:
научный опыт,
32 молочные коровы,
место проведения: США

Схема опыта F:
научный опыт,
40 молочных коров,
место проведения: Франция

Увеличение ССП

влияние на ССП (г/день)





Схема опыта F (а):
полевой опыт,
60 бычков, ССП 1700 г,
место проведения: Франция

Схема опыта F (б):
полевой опыт,
120 бычков, ССП 1550 г,
место проведения: Франция

Профилактика ацидоза*

влияние на уровень рН (%)



Улучшение переваримости**

Переваримость транзитного крахмала в тонком кишечнике (%)

