



ПРОВИМИЛК® TOTAL


Заменитель цельного
молока для телят с 4-го дня жизни

Привесы **+12%**

Телосложение **+15%**

Окупаемость
корма **+8%**

Диарея **-23%**



Cargill

Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.provimi.ru
provimi_moscow@cargill.com

Основные характеристики Провимилк Тотал (7071)

В основе молочный протеин, в том числе высококачественные молочные продукты (не менее 85%)

При производстве применяются самые строгие стандарты тестирования и контроля качества

Стимулирует потребление сухих кормов и развитие преджелудков

Подходит для любой схемы выращивания

Отвечает потребностям роста и развития современных высокопродуктивных животных

Питательность

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
Обменная энергия (макс.)	МДж/кг	17,8
Сырой протеин (макс.)	%	20
Сырой жир (макс.)	%	17
Сырая клетчатка (мин.)	%	0,05
Лактоза (макс.)	%	40
Сырая зола (мин.)	%	7
Кальций (макс.)	%	0,7
Фосфор (макс.)	%	0,6
Натрий (макс.)	%	0,5
Цинк (макс.)	мг/кг	50
Медь (макс.)	мг/кг	12
Кобальт (макс.)	мг/кг	0,1
Йод (макс.)	мг/кг	1
Железо (макс.)	мг/кг	100
Марганец (макс.)	мг/кг	40
Селен (макс.)	мг/кг	0,3
Витамин А (макс.)	МЕ/кг	77 200
Витамин D3 (макс.)	МЕ/кг	16 600
Витамин Е (макс.)	мг/кг	150
Витамин С (макс.)	мг/кг	100
Витамины группы В (макс.)		+

 **УПАКОВКА**
Бумажные мешки 20 кг

 **ФОРМА ВЫПУСКА**
Порошок

 **СРОК ХРАНЕНИЯ**
12 месяцев



Технология NuStart


- ✓ Укрепляет иммунитет
- ✓ Стабилизирует микрофлору кишечника
- ✓ Стимулирует потребление сухого корма
- ✓ Закладывает основу высокой продуктивности



Рекомендации по использованию

ДОЗИРОВКА ЗАВИСИТ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ СХЕМЫ ВЫПОЙКИ

Схема	Концентрация (сухое в-во)	Соотношение (ЗЦМ : вода)
2 раза в день	10%	100 г : 900 мл
	12,5%	125 г : 875 мл
1 раз в день	20%	200 г : 800 мл
ускоренная	15%	150 г : 850 мл



Время смешивания: не больше 5 минут


Температура выпойки: 41°C - 42°C

Выпойка: Согласно схеме

Провимилк пригоден для использования в автоматах для выпойки.

После кормления ПровиМилк® Тотал обеспечить животных чистой свежей водой, соблюдая временной промежуток 2 часа после выпойки молока или ЗЦМ.

Рекомендованная схема выпойки



Памятка по содержанию телят



- Содержать в чистоте и надлежащем гигиеническом состоянии все оборудование для кормления и поения
- Удалять остатки непотребленного концентрата и ежедневно заменять свежим
- Предложить подкормку для молодняка на ранней стадии - с 5-го дня
- Проводить отъем при потреблении от 1,5 кг концентратов в сутки
- Обеспечивать чистоту подстилки
- Всегда соблюдать режим кормления и порядок смешивания



**Nurture™ - это путь к отелу до 24 месяцев и раскрытию
полного потенциала вашего молочного стада!**

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ

Диарея среди телят - **< 3%**

Увеличение живой массы от веса при рождении к отъему **в 2 раза**

Возраст первого отела - **22-24** месяца

Живая масса первотелок - **94%** от живой массы взрослой коровы

Рост первотелок в холке - **94%** от роста в холке взрослой коровы

Специализированная продуктовая линейка Nurture™ — это современный подход к выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Специалисты Cargill предлагают уникальный подход к кормлению телят от рождения до отела в 22-24 месяца с учетом показателей их здоровья, условий содержания и особенностей управления на ферме.

Программа кормления молодняка Nurture™ включает в себя заменитель цельного молока ПровиМилк Тотал, высококачественные престартерные корма Форсаж и стартерные корма Актио, а также специальные продукты.



**Обратитесь к специалистам по кормлению Cargill и получите
индивидуальные рекомендации для вашего хозяйства.**

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к. 9
БЦ«Аэростар», подъезд 2
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.provimi.ru
provimi_moscow@cargill.com

