

ПРОВИМИЛК® СОЗДАВАЯ БУДУЩУЮ КОРОВУ



Как создать будущую корову?

В молочный период основным источником питательных веществ, энергии и здоровья телят является молоко.

ЗЦМ представляет собой безопасную и экономичную альтернативу цельному молоку. Правильный подбор ЗЦМ и должный уход за теленком в раннем возрасте влияют на продуктивность животного в течение всей жизни.

«Создавать будущую корову» — это значит достигать целевых показателей выращивания ремонтных телок в нужное время: сохранность и здоровье поголовья, развитие рубца и первый отел до 24 месяцев жизни.

Специально для достижения этих целей были разработаны заменители молока для телят Провимилк. Вся линейка продуктов ЗЦМ входит в программу кормления молодняка Каргилл Nurture™.

Описание продуктов

	Провимилк Тотал	Провимилк Опти	Провимилк Гроу
Код продукта	7071	7072	7073
Состав	Протеин 20% Жир 17% Лактоза 42% Клетчатка 0,05% max Зола 7% max	Протеин 20% Жир 16% Лактоза 38% Клетчатка 1% max Зола 7% max	Протеин 20% Жир 16% Лактоза 30% Клетчатка 1,5% max Зола 7% max
Возраст начала выпойки, дни	3	15	28
Преимущества	100% молочные протеины	Оптимальный старт	Максимальная конверсия
Основа	Сухое молоко	Сыворотка	Сыворотка
Особенности	NuStart AmNeo NeoTech4	NuStart Ферменты	NuStart Ферменты
Какой продукт выбрать?			
Ремонтные телки	✓	✓	
Интенсивный откорм бычков		✓	✓
Автоматические системы выпойки	✓		



Упаковка

Бумажный мешок 20 кг



Форма выпуска


Порошок



Срок хранения

12 месяцев

Как правильно приготовить 3ЦМ



Инструкция по смешиванию


1. Оцените температуру окружающей среды для подбора необходимой концентрации.
2. Взвесьте необходимое количество порошка. Оптимальное соотношение порошка 3ЦМ к воде 1:7.
3. В чистую емкость добавьте две трети объема горячей чистой воды (55°C).
4. Тщательно перемешайте в течение 30 секунд или до полного растворения порошка.
5. Добавьте оставшуюся треть холодной чистой воды (18°C), тщательно перемешайте.
6. Проверьте температуру готового раствора 3ЦМ.
7. Оптимальная температура раствора 3ЦМ для выпойки 41-42°C.

Рекомендуемое количество сухого вещества в готовом растворе 3ЦМ 12,5-14%. Допустимо увеличивать концентрацию 3ЦМ в зависимости от системы кормления, требуемой скорости роста и температуры окружающей среды.

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Cargill.

*CB - сухое вещество

Рекомендованная схема выпойки



Эту схему выпойки можно использовать при концентрации 12,5-15% сухого вещества в готовом растворе 3ЦМ при двукратном кормлении.

Расчет концентрации 3ЦМ*

Количество готового раствора, л

	100	120	140	160	180	200	220	240	250	
	Порошок 3ЦМ, кг									
	Вода, л									
Сухое вещество, %	10 %	10 90	12 108	14 126	16 144	18 162	20 180	22 198	24 216	25 225
	11 %	11 89	13,2 107	15,4 125	17,6 142	19,8 160	22 178	24,2 196	26,4 214	27,5 223
	12 %	12 88	14,4 106	16,8 123	19,2 141	21,6 158	24 176	26,4 194	28,8 211	30 220
	13 %	13 87	15,6 105	18,2 122	20,8 139	23,4 157	26 174	28,6 191	31,2 209	32,5 217
	14 %	14 86	16,8 103	19,6 120	22,4 138	25,2 155	28 172	30,8 189	33,6 206	35 215
	15 %	15 85	18 102	21 119	24 136	27 153	30 170	33 187	36 204	37,5 213

* Оптимальное соотношение порошка 3ЦМ к воде 1:7



Технология NuStart®

- ✓ Укрепляет иммунитет
- ✓ Стабилизирует микрофлору кишечника
- ✓ Стимулирует потребление сухого корма
- ✓ Закладывает основу высокой продуктивности



Технология AmNeo®

- ✓ Обеспечивает более высокие среднесуточные привесы до +6%
- ✓ Способствует более быстрому росту
- ✓ Телки, получавшие аминокислоты, дают в первую лактацию больше молока, скорректированного по жирности до +0,58 кг



Технология NeoTec4®

- ✓ Уменьшает диарею на 23%
- ✓ Улучшает показатели привесов молодняка на 12%
- ✓ Улучшает рост, развитие и здоровье телят
- ✓ Повышает окупаемость кормов на 8%

Cargill Innovation Center, 2016

Программа кормления молодняка Nurture™ — это путь к отелу до 24 месяцев и раскрытию полного потенциала вашего молочного стада!